

BAREM CORECTARE PROBA SCRISĂ
ASISTENȚI MEDICALI

1. TEST GRILĂ 75 PUNCTE

- | | | |
|-----|---------------------|------------------------|
| I. | COMPLEMENT SIMPLU | 0,75 PUNCTE/ ÎNTREBARE |
| II. | COMPLEMENT MULTIPLU | 1,50 PUNCTE/ ÎNTREBARE |

2. SUBIECT CLASIC 25 PUNCTE

NOTĂ: ÎNTREBĂRILE CU RĂSPUNSURI MULTIPLE VOR FI NOTATE DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE RĂSPUNSUL ESTE CORECT ȘI COMPLET.

BAREM VARIANTA 2

1	B	41	A, D
2	C	42	A, B
3	A	43	A, B
4	A	44	C, D
5	D	45	A, B
6	D	46	A, D
7	B	47	B, C
8	C	48	A, B, D
9	A	49	B, D
10	A	50	A, C
11	A	51	A, B, C
12	D	52	B, C, D
13	D	53	B, D
14	A	54	A, C
15	C	55	A, C, D
16	C	56	A, B, D
17	C	57	C, D
18	D	58	B, C, D
19	C	59	A, C, D
20	B	60	A, B, C, D
21	C	61	A, C, D
22	C	62	B, C
23	C	63	B, C, D
24	C	64	A, B, D
25	D	65	A, B, C, D
26	B	66	A, B, D
27	B	67	B, C, D
28	B	68	A, B, C
29	D	69	A, B, C, D
30	B	70	A, B, C
31	B		
32	D		
33	B		
34	B		
35	D		
36	B		
37	A		
38	C		
39	C		
40	D		

SUBIECT 5 25 PCT

EMBOLIA PULMONARĂ – DEFINIȚIE, MANIFESTĂRI CLINICE,

1. DEFINIȚIE

5 pct

2. MANIFESTĂRI CLINICE

- | | | |
|-------|---|-------|
| I. | Durerea (caracter, intensitate, iradiere) | 4 pct |
| II. | Aspect dramatic, anxietate marcată | 2 pct |
| III. | Dispnee, polipnee superficială | 2 pct |
| IV. | Cianoză | 2 pct |
| V. | Stare de șoc | 2 pct |
| VI. | Tahicardie | 2 pct |
| VII. | Hipotensiune arterială | 2 pct |
| VIII. | Hepatomegalie | 2 pct |
| IX. | Turgescența jugularelor | 2 pct |