

DE URGENȚĂ
"SF. SPIRIDON" IAȘI
Nr. 3095
Data 16 IAN. 2020

BAREM CORECTARE
LA PROBA SCRUSĂ -

- 16.01.2020

BAREM VARIANTA 2 PERSONAL AUXILIAR

PERSONAL AUXILIAR

SANITARE

1	C	21	A, B, C
2	B	22	A, B
3	A	23	B, C
4	C	24	A, C
5	B	25	A, B, C
6	B	26	A, B
7	C	27	A, C
8	C	28	A, B
9	A	29	A, B
10	A	30	A, B
11	B	31	A, B, C
12	A	32	B, C
13	B	33	A, B, C
14	A	34	A, B, C
15	A	35	A, B, C
16	B	36	A, B, C
17	B	37	A, B
18	B	38	A, B, C
19	A	39	A, C
20	C	40	A, B, C

SUBIECT 1

Măsurile standard includ:

1. igiena mâinilor, care este esențială pentru a reduce riscul de răspândire a infecțiilor. Utilizarea antisepticelor alcoolice este metoda preferată în toate situațiile clinice, cu excepția cazurilor când mâinile sunt vizibil murdare (de exemplu, sânge, alte fluide biologice) sau după examinarea pacienților cu infecție cu *Clostridium difficile* sau norovirus, situații în care trebuie utilizate apa și săpunul;

4 pct

2. utilizarea echipamentului individual de protecție (de exemplu: mănuși, halate, protectoare faciale), în funcție de expunerea anticipată. Igiena mâinilor este întotdeauna etapa finală după îndepărtarea și aruncarea echipamentului;

4 pct

3. practici sigure de injectare, proceduri specifice pentru a preveni transmiterea bolilor infecțioase de la un pacient la altul sau între un pacient și personalul medical în timpul preparării și administrării medicamentelor de uz parenteral;

4 pct

4. manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale sau contactul cu suprafețele potențial contaminate din imediata apropiere a pacientului, proceduri specifice pentru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la un pacient la altul sau între un pacient și personalul medical în timpul manipulării echipamentelor medicale și contactul cu obiectele sau suprafețele din mediu;

4 pct

5. igiena respiratorie și eticheta de tuse (tehnica de tuse și strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică folosință cu poziționarea la minimum 1 metru față de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor), ca element al precauțiilor standard care se adresează în primul rând pacienților și însoțitorilor acestora cu simptomatologie de posibilă infecție respiratorie care se aplică oricărei persoane cu asemenea manifestări când intră în unitatea sanitară. Acest element al precauțiilor standard este aplicat pentru prevenirea promptă a infecțiilor respiratorii și trebuie aplicată la intrarea în unitatea sanitară (zonele de recepție și de triaj ale pacienților).

4 pct

SUBIECT 2

TRANSPORTUL CU TARGA

Pregătirea pacientului

- se informează atât pacientul cât și aparținătorii asupra scopului transportului și locului unde va fi transportat **2 pct**

- se explică procedeul așezării pe targă și eventual se instruiește pacientul cum poate colabora **2 pct**

- în cazul în care pacientul are instalate o perfuzie, sonde, drenuri etc. se vor lua măsuri de siguranță: sprijinirea- eventual pe un suport - a aparatului de perfuzie; fixarea sau pensarea sondelor etc. în funcție de durata și condițiile de transport **2 pct**

- în caz de vărsături – tăviță renală **2 pct**

- se pregătește documentația pacientului **2 pct**

Așezarea pacientului pe targă

- pacientul va fi așezat cu privirea în direcția mersului (trebuie să vadă unde merge) **2 pct**

- la urcatul scărilor, brancardierul din urmă va ridica targa până la nivelul orizontal; **2 pct**

- dacă panta este prea accentuată, se poate duce pacientul, la urcuș, cu capul înainte. **2 pct**

- De asemenea, când pacientul trebuie supravegheat tot timpul, este mai bine ca acesta să fie dus cu capul înainte, pentru ca, stând față în față cu brancardierul, să poată fi supravegheat. **2 pct**

- în principiu, pacientul va fi prins de partea sănătoasă **2 pct**