

**BAREM VARIANTA 2 PERSONAL AUXILIAR**

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. SPIRIDON" IAȘI	
Nr. _____	<i>G. B. B.</i>
Data _____	

1	A	21	A, B, C
2	C	22	A, B, C
3	C	23	A, B, C
4	C	24	A, B, C
5	B	25	B, C
6	A	26	A, C
7	B	27	A, C
8	A	28	A, B
9	B	29	B, C
10	B	30	A, B, C
11	C	31	A, B, C
12	C	32	A, B
13	C	33	A, C
14	B	34	A, B
15	B	35	A, B, C
16	A	36	A, C
17	B	37	A, C
18	B	38	A, B
19	A	39	A, B
20	C	40	A, B

03 FEB. 2020

Măsurile standard includ:

1. igiena mâinilor, care este esențială pentru a reduce riscul de răspândire a infecțiilor. Utilizarea antisepticelor alcoolice este metoda preferată în toate situațiile clinice, cu excepția cazurilor când mâinile sunt vizibil murdare (de exemplu, sânge, alte fluide biologice) sau după examinarea pacienților cu infecție cu *Clostridium difficile* sau norovirus, situații în care trebuie utilizate apa și săpunul;

**4 pct**

2. utilizarea echipamentului individual de protecție (de exemplu: mănuși, halate, protectoare faciale), în funcție de expunerea anticipată. Igiena mâinilor este întotdeauna etapa finală după îndepărtarea și aruncarea echipamentului;

**4 pct**

3. practici sigure de injectare, proceduri specifice pentru a preveni transmiterea bolilor infecțioase de la un pacient la altul sau între un pacient și personalul medical în timpul preparării și administrării medicamentelor de uz parenteral;

**4 pct**

4. manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale sau contactul cu suprafețele potențial contaminate din imediata apropiere a pacientului, proceduri specifice pentru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la un pacient la altul sau între un pacient și personalul medical în timpul manipulării echipamentelor medicale și contactul cu obiectele sau suprafețele din mediu;

**4 pct**

5. igiena respiratorie și eticheta de tuse (tehnica de tuse și strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică folosință cu poziționarea la minimum 1 metru față de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor), ca element al precauțiilor standard care se adresează în primul rând pacienților și însoțitorilor acestora cu simptomatologie de posibilă infecție respiratorie care se aplică oricărei persoane cu asemenea manifestări când intră în unitatea sanitară. Acest element al precauțiilor standard este aplicat pentru prevenirea promptă a infecțiilor respiratorii și trebuie aplicată la intrarea în unitatea sanitară (zonele de recepție și de triaj ale pacienților).

**4 pct**

## **CAPTAREA URINII**

### **EFECTUAREA PROCEDURII:**

1. La pacientul in stare gravă, care necesită ajutor

- Spălați mainile **2 pct**
- Imbrăcați mănuși de unică folosință **2 pct**
- Ridicați pătura **2 pct**
- Protejați patul cu mușama și aleză **2 pct**
- Dezbracați partea inferioară a corpului (daca este cazul) **2 pct**
- Încălziți plosca sau urinarul prin clătire cu apă caldă și uscați prin ștergere cu hartie igienică **2 pct**
- Introduceți plosca sub pacient respectând pașii de la captarea materiilor fecale sau așezați urinarul între coapsele pacientului **2 pct**

2. La pacienții de sex masculin

- Penisul se introduce în urinar sau se orientează spre plosca (bazinet), lăsați pacientul câteva minute singur **2 pct**
- Îndepărtați plosca și urinarul **2 pct**
- Ajutați pacientul să-și spele mainile **2 pct**