



BAREM VARIANTA 1 AS.MED.

1	B	31	B, D
2	C	32	A, B
3	C	33	A, B, C
4	C	34	A, B, C
5	D	35	A, B
6	B	36	C, D
7	A	37	A, B, C
8	C	38	B, D
9	A	39	A, B, C
10	B	40	A, B, C
11	C	41	A, B
12	B	42	B, C, D
13	A	43	A, B, C
14	B	44	A, C, D
15	B	45	A, B, C
16	D	46	B, C, D
17	B	47	A, B, C, D
18	C	48	A, B, D
19	D	49	A, C, D
20	C	50	A, C, D
21	A		
22	C		
23	B		
24	C		
25	A		
26	A		
27	B		
28	D		
29	D		
30	B		

RASPUNSURI GRILA CORECTE 1-30 SUNT NOTATE CU 1 PCT – 30 PUNCTE

RASPUNSURI GRILA CORECTE 31-50 SUNT NOTATE CU 1.5 PCT-30 PUNCTE

SUBIECT II – 20 PUNCTE

SUBIECT III- 20 PUNCTE

TOTAL BAREM : 100 PCT

SUBIECTUL II

2. Oxigenoterapia

Manifestări de dependență legate de oxigenarea insuficientă: 7 pct

- 1 pct - fatigabilitate, agitație;
- 1 pct - respirație superficială (frecvență crescută);
- 1 pct - ortopnee ;
- 1 pct - mișcări ale aripilor nasului;
- 1 pct - cianoza pielii, buzelor și unghiilor;
- 1 pct - cefalee, amețeli, somnolență;
- 1 pct - confuzie, agresivitate.

Materiale necesare:

5 pct

- 1 pct - sursa de oxigen: priza de perete, dispozitivul portabil, butelia de oxigen concentrat sau unitatea cu oxigen lichid;
- 1 pct - barbotorul sau umidificatorul – pentru umidificarea O₂;
- 1 pct - debitmetru – un indicator folosit pentru a regla cantitatea de oxigen furnizată pacientului și care este atașată sursei de oxigen;
- 0.5 pct - canula nazală
- 0.5 pct - sonda endo-nazală
- 0.5 pct - ochelari de oxigen, cort de oxigen (mai rar);
- 0.5 pct - masca buco – nazală cu sau fără reinhalarea aerului expirat, utilizată pentru pacienții care au nevoie de terapie cu oxigen pe termen mai lung

Pregătirea fizică :

8 pct

- 1 pct - se face dezobstrucția căilor respiratorii superioare;
- 1 pct - se instruește pacientul să rămână la pat în timpul administrării și să evite manipularea unor obiecte gen brichetă, pentru că oxigenul este un gaz combustibil care întreține arderea;
- 1 pct - se măsoară pe obraz distanța de la nară la tragus;
- 1 pct - se introduce sonda nazală sterilă pe distanța măsurată și se fixează cu romplast pe obraz;
- 1 pct - se aplică masca pe gură și pe nas și se fixează cu banda elastică reglabilă;
- 1 pct - se reglează presiunea și debitul de administrare la 4-6l/min. sau în funcție de recomandarea medicului;
- 1 pct - se supraveghează comportamentul pacientului în timpul oxigenoterapiei;
- 1 pct - se monitorizează funcțiile vitale : R, P, T.A., saturația în oxigen a sângelui arterial cu ajutorul pulsoximetrului.

SURTECUL III ✓

2. Plagile

Semne locale

4 pct

- 1 pct - lipsa de continuitate la nivelul pielii
- 1 pct - sangerare
- 1 pct - durere
- 1 pct - impotenta functionala

Semne generale

8 pct

- 2 pct - pulsul, care poate sa fie rapid si de amplitudine redusa in caz de plagi insotite de hemoragie sau de soc traumatic
- 2 pct - tensiunea arteriala, care, daca scade, poate fi si ea un semn alarmant, aratand prezenta unei hemoragii externe sau interne sau a unui soc traumatic
- 1 pct - temperatura poate fi ridicata in cazul plagilor infectate
- 1 pct - leucocitoza creste in plagile infectate
- 2 pct - hemoglobina, hematocritul si numarul de globule rosii scad in caz de hemoragii importante

Primul ajutor

8 pct

- 2 pct - scoaterea accidentatului din mediul in care sufera traumatismul (daca este un mediu nociv inca)
- 2 pct - oprirea provizorie a hemoragiei
- 2 pct - aplicarea unui pansament protector
- 2 pct - transportarea accidentatului intr-un serviciu chirurgical pentru a se aplica tratamentul definitiv al plagii